



Hond of kat komt niet buiten, of komt buiten maar heeft geen direct contact met park, zandbak, (ontlasting van) soortgenoten, speelweide, rauw vlees, slakken of prooidieren



Hond of kat komt buiten en heeft wel direct contact met (ontlasting van) soortgenoten, park, zandbak of speelweide

Eet prooidieren en/of slakken en/of gaat mee op jacht



NEE Eet rauw vlees

NEE

RISICOGROEP B

4 x per jaar ontwormen tegen spelwormen^{a,b,c}



Hond woont in gebied waar vossenlintworm (*Echinococcus multilocularis*) voorkomt (bijv. Zuid-Limburg of Oost-Groningen in NL¹, of ten zuiden van de rivieren Samber en Maas² in BE) en eet prooidieren en/of gaat mee op jacht



JA

JA

RISICOGROEP C

Vaker dan 4 x per jaar ontwormen tegen spelwormen, afhankelijk van de mate van opname van rauw vlees/prooidieren/slakken^{a,b,c}

RISICOGROEP D

Maandelijks ontwormen tegen lintwormen; voor ontwormingsadvies tegen spelwormen, volg overige vragen^{a,b,c}

a. Indien lintwormsegmentjes worden gezien rond de anus of in de ontlasting: ontworm tegen lintwormen en start vlooiënbestrijding
 b. Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van hond of kat is een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies
 c. Ruim de ontlasting direct op en deponeer die in een grijze container (gewoon afval) en niet in de GFT-bak op de composthoop

	Laag risico	Medium risico	Hoog risico
Risico groepen: [*]	A	B	C / D

Ontwormingsadvies pups en kittens (jonger dan 6 maanden)**

Pups moeten routinematig ontwormd worden met een geschikt ontwormingsmiddel vanaf een leeftijd van 2 weken, waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het spenen. Vervolgens maandelijks tot een leeftijd van een half jaar.

Lacterende teven worden gelijktijdig met de pups ontwormd, omdat zij een patente infectie kunnen hebben (opname van larven via oplikken ontlasting van de pups).

Aangezien er bij kittens geen sprake is van een prenatale infectie - ze worden niet besmet in de baarmoeder - kan de behandeling gestart worden op een leeftijd van 3 weken en iedere 2 weken herhaald tot 2 weken na het spenen. Vervolgens maandelijks tot een leeftijd van een half jaar.

Lacterende poezen worden gelijktijdig met de de kittens ontwormd omdat zij een patente infectie kunnen hebben (opname van larven via oplikken ontlasting van de kittens).

Risico groepen* In het geval van de spouworm (*Toxocara spp.*) wordt een maandelijks behandelingsinterval aanbevolen bij huisdieren in situaties met risico voor de volksgezondheid, zoals verblijf bij een familie met kleine kinderen waarbij het dier regelmatig in de tuin of elders buiten komt. Dit geldt ook voor huisdieren bij personen met verminderde weerstand. Deze vallen ook in risicogroep D.

1. J.W.B. van der Giessen*, Y.B. Rombout, J.H. Franchimont, L.P. Limper, W.L. Homan, (1999): Detection of Echinococcus multilocularis in foxes in The Netherlands, Veterinary Parasitology 82: 49-57.
2. Hanosset R, Saegerman C, Adant S, Massart L, Losson B, 2008 Feb 14: Echinococcus multilocularis in Belgium: prevalence in red foxes (Vulpes vulpens) and in different species of potential intermediate hosts, Vet Parasitol. 151, (2-4): 212 -7.

* ESCCAP guidelines 2017

** ESCCAP Modulaire richtlijnen: wormbesmetting bij hond en kat



Voor verdere informatie contacteer Elanco Animal Health:

Tel. NL: +31 (0) 306 025 952 | E-mail: benelux@elanco.com | Post: Postbus 8580, 3503 R N Utrecht